

Bemerkenswerte neue Moos- und Pflanzenfunde in einem quelligen Zwischenmoor

Landkreis Wunsiedel i. F. – TK 5938/4 Marktredwitz

Walter Hollering, 2019




Moose der Roten Liste

• <i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.	RL V
• <i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen	RL 3
• <i>Fuscocephaloziopsis connivens</i> (Dicks.) □ □ □	RL 3
• <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs (FFH-II-Art)	RL 1
• <i>Meesia triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångstr.	RL 1
• <i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid.	RL 3
• <i>Plagiomnium elatum</i> (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.	RL 3
• <i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.	RL 3
• <i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray	RL 3
• <i>Sphagnum angustifolium</i> (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen	RL 3
• <i>Sphagnum centrale</i> C.E.O.Jensen	RL D
• <i>Sphagnum contortum</i> Schultz	RL 1
• <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	RL 3
• <i>Sphagnum obtusum</i> Warnst.	RL 1
• <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	RL 3
• <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	RL 3
• <i>Sphagnum subsecundum</i> Nees	RL 2
• <i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångstr.	RL 2
• <i>Sphagnum warnstorffii</i> Russow	RL 2
• <i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Hedenäs	RL 3
• <i>Warnstorfia exannulata</i> (Schimp.) Loeske	RL 3

**Moor-Widertonmoos (*Polytrichum strictum*) RL 3,
Gefiedertes Riccardimoos (*Riccardia multifida*) RL 3**



Firnisglänzendes Krückstockmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)
RL 1 , FFH Anhang-II Art,
Stumpfblättriges Torfmoos (*Sphagnum obtusum*) RL 1,
Gedrehtes Torfmoos (*Sphagnum contortum*) RL 1, mit Stammquerschnitt



**Vegetation mit Sumpf-Calla (*Calla palustris*) RL 3,
Fieberklee (*Menyanthes trifoliata*) RL 3 und neu:
Kleiner Wasserschlauch (*Utricularia minor*) RL 3.**




**„Eiszeitrelikt“ Bastard-Sonnentau mit sterilen
Samenkapseln (*Drosera x obovata*) RL 3**



Neufund für Nordostbayern durch
Walter Hollering 2019

Verbreitung in Bayern



Drosera anglica x rotundifolia
Bastard-S.

295 Angaben aus 118 Quadranten, davon:


287 Quadranten-Angaben
3 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)
5 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)

**„Eiszeitrelikt“ Langblättriger Sonnentau (rechts)
(*Drosera anglica*) RL 2**



Neufund für Nordostbayern durch
Walter Hollering 2019

Verbreitung in Bayern



***Drosera anglica* Huds.**
Langblättriger S.

1596 Angaben aus 289 Quadranten, davon:

1547 Quadranten-Angaben

26 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)

18 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)

Historische Daten nördlich der Donau:

- Vollmann 1914: „**Nj** Deusmauer im obersten Tal der Schwarzen Laaber“.

BIB: *Zusätzliche Anmerkung für Synonym *Drosera longifolia* L. :*

Im Alpenvorland zwar noch verbreitet (Mitt. W. Kraus), besiedelt aber neben Übergangsmooren zusammen mit *D. rotundifolia* und *D. x obovata* auch den am stärksten gefährdeten Moortyp (Quellmoore) und ist ausschließlich auf hydrologisch völlig intakte Strukturen (Quellrinnsale und -schlenken) beschränkt (Mitt. Ch. Niederbichler, B. Quinger).

„Eiszeitrelikt“ Zierliches Wollgras (*Eriophorum gracile*) RL 1



Wiederfund für Nordbayern durch
Werner Gebhardt und Walter Hollering
2019


Zierliches Wollgras (*Eriophorum gracile*) RL 1



Zierliches Wollgras (*Eriophorum gracile*) RL 1



Aktuelle Verbreitung in Bayern



Historische Daten von Oberfranken und Nordbayern:

- TK 5936/2: sumpfige Wiesen bei Gefrees (Funck 1802, vgl. Flora Bad Berneck 2017)
- TK 5738/4: „**Wf** Grünheid“ aus Vollmann 1914 (1750 – 1899 Literaturerfassung für den Bayernatlas, aus der Hepp Blum Kartei)
- Neustadt b. Coburg (vor 1945)
- Limmersdorfer Forst (vor 1945)
- Kartenblatt Deining TK 6735/2; NSG „Deusmauer Moor“ östlich Neumarkt i. d. Oberpfalz (1896)